



West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.
Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Première observation au Sénégal du Martinet marbré *Tachymarptis aequatorialis*

Au cours d'un séjour au Parc National du Niokolo Koba en février 1986, je me suis rendu au Grand Mirador qui domine la fleuve Gambie entre Simentie et Wouring (13°05'W, 13°25'N). Là, mon attention fut attirée par un martinet de grande taille évoluant à hauteur du mirador d'un vol rapide. L'oiseau disparut puis, quelques instants plus tard, ce fut un groupe de neuf individus qui revint. Ceux-là restèrent une dizaine de minutes à voler dans les environs immédiats et la nature du site me permettait d'observer les oiseaux tantôt par-dessus tantôt par-dessous et parfois de bien près. D'un brun uniforme au-dessus, ces oiseaux avaient le ventre et la poitrine comme finement barrés; de plus, la queue était légèrement fourchue. Ces éléments me permirent de déterminer cette espèce comme le Martinet marbré *Tachymarptis aequatorialis*, espèce qui fréquente habituellement les régions montagneuses et qui, jusqu'à présent, n'était pas connue en Afrique de l'ouest, au nord de la Sierra Leone (Fry *et al.* 1988).

Toutefois, A. le Dru (com. pers.) observa ce martinet à plusieurs reprises en Guinée dans les arrondissements de Mamou, Kindia et Forécariah et jusqu'à 500 sujets en migration le 10 janvier 1988 dans la région de Fria. Ces différents sites guinéens sont séparés du nôtre par le massif du Fouta Djallon et distants d'environ 300 km.

Les jours suivants, et au cours des autres séjours effectués au Sénégal oriental, j'ai recherché en vain cette espèce dans des sites comparables ou *a priori* favorables.

Je remercie A. Le Dru pour la permission de reproduire ici ses notes.

Bibliographie

FRY, C.H., KEITH, S. & URBAN, E.K. (1988) *The Birds of Africa*, vol. 3. Academic Press, London.

Réçu 23 janvier 1992

Richard Devisse
34, rue Emile Debrie, 80450 Camon, France

Road-kills of three nightjar species near Niamey, Niger

Over a period of seven weeks in 1990, starting on 6 September, I found 63 vehicle-killed nightjars on a 20 km stretch of laterite road, leading from the checkpoint near Niamey south towards Say. The three species identified were Standard-wing Nightjar *Macrodipteryx longipennis*, Plain Nightjar *Caprimulgus inornatus* and Long-tailed Nightjar *C. climacurus*. Between 22 October and 18 November I travelled somewhat less frequently along this road and found no further dead nightjars. The road is more or less parallel to the Niger river and quite close to it (100-400 m) for the first 7 km, after which it veers away to a maximum distance of about 5 km. It mostly passes through millet and fallow fields in broad sandy valleys, with areas of laterite plateau nearby.