



**West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain**



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.
Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Oiseaux nouveaux pour la République Centrafricaine ou dont les notifications de ce pays sont peu nombreuses

par Max Germain¹ et Jean-Paul Cornet²

¹44 rue Cluseret, 92150 Suresnes, France

²ORSTOM, B.P. 1386, Dakar, Sénégal

Reçu 10 juillet 1993

Revu 19 janvier 1994

Résumé

Nous fondant sur nos investigations en République Centrafricaine et étude de spécimens déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) au cours des 20 dernières années, nous signalons de ce pays 12 espèces qui n'y avaient pas, jusqu'ici, été enregistrées. Des informations faunistiques sont également apportées qui ont trait à quelques autres espèces et concernent souvent des données récentes, notamment certaines de celles fournies par Carroll (1988).

Summary

Based on field observations and the examination of specimens received during the last 20 years by the Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) 12 species which had not been previously documented from Central African Republic are reported. Additional information on other species and on some recent records, especially those provided by Carroll (1988), is also presented.

Introduction

Le propos, essentiellement faunistique, de cette note est de faire état d'un certain nombre de captures et observations ayant porté, en République Centrafricaine, sur des espèces qui n'en avaient pas jusqu'ici été signalées, de première notification récente pour ce pays (postérieure à Green 1983) ou dont les records préexistants sont peu nombreux. La plupart des données que nous rapportons ont été recueillies au cours d'investigations virologiques (ORSTOM et Institut Pasteur) ayant nécessité, de 1969 à 1978, la capture et la dissection d'un grand nombre d'oiseaux; elles ne représentent qu'une part de l'information ornithologique réunie en cette circonstance. Certaines d'entre elles, qui contribuent à préciser sensiblement la géographie d'une répartition, nous paraissent présenter un intérêt immédiat alors que s'élabore une checklist des oiseaux de RCA (R.J. Dowsett en prép.). Carroll (1982, 1988), s'essayant à dresser

une telle liste, y a introduit quelque confusion, ayant insuffisamment tenu compte de la littérature préexistante et s'étant quelquefois risqué à faire état d'observations originales qui eussent appelé plus de réserve critique (R.J. Dowsett & M. Germain en prép.); il lui est en outre arrivé de mal interpréter des informations non publiées venues en sa possession, donnant alors place à des observations inexistantes (Germain 1992). Les informations reprises par Carroll (1988), seule facilement accessible, ne s'accompagnent pas de renvois précis à leurs sources respectives; il nous a donc paru indispensable d'inclure, dans la seconde des listes qui vont suivre, celles de nos observations ayant été mises à contribution par cet auteur (bassin de la Lobaye et région de Bangui principalement), chaque fois qu'elles portent sur des espèces entrant dans le propos que nous avons défini. Nous l'avons fait dans le souci de confirmer leur authenticité et de préciser leur localisation.

Présentation des données

Le corps principal de notre information provient de captures au filet conduites de septembre 1971 à décembre 1978 (environ 4500 oiseaux capturés, MG et JPC). Ont également été retenues un certain nombre de captures intéressantes réalisées en 1969 et 1970 par Dr Jérôme Moindrot, qui fut le premier en charge du programme épidémiologique ayant permis ces observations. Des oiseaux n'ont qu'exceptionnellement été obtenus au fusil. Certaines données font référence à des spécimens de RCA déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (MNHN), par Charlotte Choux (CC), Raymond Pujol (RP), Jérôme Moindrot (JM) ou l'un de nous (MG, auquel cas la mention MNHN figure seule). Le matériel provenant de Lotémo, dans l'extrême sud du département de la Lobaye, a été récolté par notre collègue Jean-Pierre Hervé (JPH). Une collection de référence avait été constituée, à l'Institut Pasteur de Bangui, à partir du matériel récolté en RCA (387 spécimens). Cette collection, entreprise dès 1969 par J. Moindrot et à laquelle il sera quelquefois fait référence (IPB), fut perdue quelque dix ans plus tard, du fait de malencontreuses initiatives auxquelles nous n'eumes aucune part. Toutes les déterminations en avaient été vérifiées par l'un de nous (MG).

Nous dénommons "exemplaire" tout oiseau ayant été déterminé en main, même s'il n'a pas été conservé. Les sujets figurant dans les collections du Muséum se signalent par la mention MNHN.

Les divisions phytogéographiques sont celles proposées par Boulvert (1986), soit, du sud au nord: domaine congo-guinéen, secteurs de la forêt dense humide (SF) et périforestier (SPF, mosaïque forêt-savane); dom. soudano-guinéen (DSG); dom. médio-soudanien (DMS); dom. soudano-sahélien (DSS). On trouvera, en annexe, un index des localités citées; celles-ci sont toutes à moins de 600 m d'altitude, à l'exception de Bouar (100 m), Bocaranga (1070 m) et Sarki (1170 m), qui appartiennent à l'étage submontagnard.

C'est d'un secteur de 150 km de rayon, s'étendant du sud-ouest au nord de Bangui, que provient le plus grand nombre des captures et observations: forêt dense de la basse Lobaye et savanes périmforestières la jouant, entrée des savanes soudano-guinéennes leur succédant au nord. Dans plusieurs des stations: Botambi (SF), Landja, Mboko, Ndélé près Bangui, Geringou, Ngoundji (SPF) et Bozo (DSG), des captures s'étendant sur plusieurs jours consécutifs ont été régulièrement pratiquées, plusieurs fois par an et en toutes saisons, pendant les sept années qu'a duré le programme (la mention "près Bangui", pour le village de Ndélé, est une convention de notre part, visant à écarter toute confusion avec la localité du même nom située dans le nord de la RCA). Des captures ponctuelles ont également été conduites dans les régions de Berbérati (Nassoulé, Gamboula), Carnot (Nandobo), Sarki, Bossembélé (Bogoin), Bouca (Marali), Sibut, Grimari (Zagwa), Bambari (Marago) et Bangassou (Nagbalaka); les régions de Bossangoa (Doumba), Rafai, ainsi que la zone subsaharienne (Garba, lac Mamoun), ont été prospectées par J. Moindrot. Dans la région de Bangui, la saison des pluies s'étend d'avril à octobre; mars et novembre sont des mois de transition. L'été de l'Oubangui a lieu de février à avril.

Espèces nouvelles pour la République Centrafricaine

Aigle-autour africain *Spizaetus africanus*. Une femelle immature capturée par un villageois à Mboro (SF, près de Mbaiki), début janvier 1975. Aile 343; queue 260; tarse 79, emplumé jusque sur la base des premières phalanges; tête roux rosé, striée de brun sur la calotte; poitrine comme la tête, un peu plus claire, striée; ventre et sous-caudales blancs, ces dernières, ainsi que les flancs, tachées de roussâtre; parties supérieures brunes; rectrices brunes barées de plus sombre, avec liseré blanchâtre à l'extrémité. Exemplaire perdu (IPB). Espèce forestière connue, dans cette région, de la rive zairoise de l'Oubangui (Libenge, Schouteden 1962).

Bécassine sourde *Lymnecryptes minimus*. Landja (SPF, près de Bangui), 24 jan 1970, un ex., MNHN. Cette espèce est un visiteur d'hiver régulier autour du lac Tchad; ses notifications sont peu nombreuses au sud de la zone sahélienne, tant au Cameroun qu'au Soudan (Louette 1981, Nikolaus 1987).

Hirondelle de rivage du Congo *Riparia congica*. Une femelle (ovaire très petit) tuée, 7 mai 1978, dans une bande d'une trentaine de petites *Riparia*, sur un banc de sable de l'Oubangui, quelques km en aval de Bangui. Parties inférieures uniformément blanches, du menton aux sous-caudales; amorce bilatérale d'un bandeau pectoral d'un brun grisâtre clair, à bords flous; parties dorsales du même brun, un peu plus sombre et uniforme; aile 88; spécimen perdu (IPB). Cette espèce, dont la distribution épouse les cours inférieur et moyen du Congo, n'avait pas jusqu'ici été observée en amont d'Impfondo, sur l'Oubangui (Keith *et al.* 1992). Sa capture près de Bangui accroît de quelque 400 km sa distribution connue le long de cet affluent. Elle n'induit pas de sympatrie partielle avec l'Hirondelle paludicole *R.*

paludicola, observée dans la même région mais peu susceptible de s'y reproduire; suivant Hall & Moreau (1970), ces hirondelles constituent avec l'Hirondelle de rivage *R. riparia* une super-espèce. Il semble s'agir d'une implantation faible ou d'incursions liées à un certain erratisme, soit à partir de l'aval, soit à partir du bassin de la Lua (région de Géména, Zaïre) où l'espèce a été observée (Schouteden 1962). *R. congica* est toutefois considérée comme sédentaire dans ses quartiers les mieux connus (Chapin 1953, Turner & Rose 1989).

Hirondelle de Preuss *Hirundo preussi*. Géringou (SPF, entre Bangui et Damara), 12 juin 1976, mâle, MNHN. Autres exemplaires: Géringou, avr et juin, femelles; Landjia, avr, mâle. Populations sporadiquement implantées, toujours le long de cours d'eau, dans le domaine congo-guinéen et le sud du domaine soudano-guinéen; observées de la région de Berbéati à celle de Bagassou: Nassoulé (sep), Bangui (avr, juin, août), rivière Ombella au nord de Damara (avr, sep), Ngaoda (avr), Kembé (mars), Dékolo (avr). nidifie sous les ponts, en colonies qui peuvent être très denses (environ 2800 nids sous le pont enjambant la Mbari à Dékolo). Construction observée en avril, des jeunes encore au nid ou s'essayant à voler à la mi-juin.

Merle à queue rousse *Cichladusa ruficauda*. Six spécimens de Bangui (SPF), déposés au MNHN: mâles 17 jan 1978, 13 fév 1978, 25 mars 1978 immature; femelles 25 mars 1978, 17 nov 1971; adulte non sexé 21 nov 1967 (RP). Régulièrement observé dans les parcs et jardins de Bangui, qui sont les lieux où il est apparu le plus souvent dans nos filets (7 ex. en tout); également obtenu à Landjia et Mboko, en savane arbustive, en janvier et juin; à Botambi (SF), dans des clarières de culture (juin et août); non rencontré ailleurs en RCA. Manifestement sédentaire, cet oiseau se reproduit vraisemblablement en saison sèche: chant surtout entendu de février à mai; un ovaire en début d'activité constaté début janvier, capture dans le même filet d'une femelle et d'un immature, fin mars. L'aire de distribution connue de l'espèce intéresse l'ouest de l'Angola et la basse vallée du Congo jusqu'au confluent de l'Oubangui; les observations faites à Bangui révèlent sa présence près de 550 km en amont de ce dernier point. Cet oiseau serait à rechercher sur tout le cours inférieur de l'Oubangui, le long duquel il a probablement progressé. Tout donne à penser que son installation dans la région de Bangui est relativement récente; l'habitude qu'il a de se percher très en évidence, au sommet d'un buisson ou d'un arbuste, pour émettre un chant particulièrement sonore, le brun-roux vif de son plumage, sa fréquentation des jardins, rendent en effet peu vraisemblable qu'il soit demeuré inaperçu d'observateurs tels que Dybowski, Alline et Blancou.

Fauvette des jardins *Sylvia communis*. Sarki (DSG), 23 jan 1973, capture de deux mâles et une femelle (IPB). Ces captures sur les contreforts orientaux de l'Adamaoua n'offrent rien d'inattendu; *S. communis* est un visiteur d'hiver signalé du Cameroun, du Tchad, du Soudan et du nord du Zaïre (Louette 1981, Salvan 1967-1969, Nikolaus 1987, Schouteden 1962).

Astrild-mésange *Pholidornis ruficauda*. Botambi (SF), 10 mai 1978, capture d'une femelle. Ventre et croupion d'un jaune franc: il s'agit de *P. r. denti*, sous-espèce

occupant le centre et l'est du bloc forestier équatorial, à laquelle Louette (1981) rapporte également les populations du sud-est du Cameroun. L'ovaire était au repos. Gobe-mouches à lunettes blanches *Muscicapa caerulescens*. La Maboké (SF), 2 juil 1966 (RP), un adulte, MNHN. Capture contribuant à combler, pour cette espèce forestière, un hiatus marginal de la répartition connue, entre le sud du Cameroun et le nord du Zaïre (Louette 1981, Hall & Moreau 1970).

Étourneau à queue étroite *Poecoptera lugubris*. La Maboké, 13 juil 1968, un mâle, (RP) MNHN. Même remarque géographique que l'espèce précédente.

Soui-manga de Reichenow *Nectarinia preussi*. Sarki (DSG), 27 jan 1973: un mâle, bec 15, MNHN; une femelle, bec 13, MNHN. Espèce orophile forestière dont l'aire occidentale intéresse, au Cameroun, les grands massifs du sud-ouest, les bombements du relief dans la région de Yaoundé et l'Adamaoua (Germain *et al.* 1973); sa capture sur les prolongements orientaux de ce dernier plateau n'offre donc rien de suprenant. Louette (1981) note que les populations de la région de Yaoundé et de l'Adamaoua se caractérisent par un bec plus court (inférieur aux 16-19 de la forme nominale) et reconnaît la sous-espèce *genderuensis*; nos spécimens présentent bien cette même caractéristique. Ils ont été capturés dans une ripisylve; l'ovaire de la femelle était actif.

Tisserin tricolore *Ploceus tricolor*. Deux spécimens de la Maboké (SF), MNHN: 14 juil 1966 (RP), adulte non sexé, poitrine et ventre d'un brun terne et sombre; 12 juil 1968 (RP), non-sexé, subadulte, même caractères de coloration mais haut de la poitrine taché légèrement de roux. Espèce forestière présente dans le sud du Cameroun (race nominale) et au Zaïre. Les caractères de coloration donnent à penser que les exemplaires de la Maboké sont des femelles de la race *interscapularis* Reichenow (à laquelle sont rapportées les populations voisines du nord-ouest du Zaïre, région de Géméné, Schouteden 1962) ou l'expression d'un cline entre les deux formes.

Euplecte de Gierow *Euplectes gierowii*. Bangui (SPF), 19 août 1969 (CC), un mâle en plumage nuptial, MNHN. Non signalée du Cameroun (Louette 1981), cette espèce l'est par contre, au Zaïre, de régions voisines de la nôtre (territoires de Bosobolo et Géméné notamment, Schouteden 1962).

Espèces dont la première notification pour la RCA est récente ou les records existants peu nombreux

La fonction de cette partie est notamment de préciser le contenu et la localisation d'un certain nombre d'observations non publiées que la liste fournie par Carroll (1988) rapporte de façon ambiguë ou peu précise. Lorsque nos observations ont pour effet d'étendre sensiblement une aire géographique ou de donner lieu à des considérations d'ordre infraspécifique, remarque en est faite dans le texte. Les références figurant entre parenthèses après l'annonce de chaque espèce sont celles

des notifications déjà existantes; Bouet (1944) rend compte des spécimens déposées au MNHN par Dybowski au retour de sa mission dans les régions qui nous intéressent (1891-92), ainsi que des récoltes d'Alline dans les années 1930. Nos propres notifications ne viennent qu'à la suite.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*. (Bouet 1955, Snow 1978, Green 1984, Carroll 1988). Espèce présente en toutes saisons à Bangui et dans ses environs (Landjia, Mboko), neuf ex., dont deux certainement de la sous-espèce paléarctique *minutus* (oct-nov). Observation d'un immature à Bozo, oct.

Butor à tête blanche *Tigriornis leucolophus*. (Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bobia, un ex., avr (IPB); Kinga, un ex. tué par un chasseur, juil.

Aigrette intermédiaire *Egretta intermedia*. (Dragesco 1961, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Bretagnolle 1993). Landjia 19 déc 1974, observation de deux individus. Erratique saisonnier dans le sud de la RCA.

Sarcelle à oreillons *Nettapus auritus*. (Malbrant 1952, Snow 1978, Gren 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Landjia, 19 nov 1972, observation d'un individu. Déjà signalée de la région de Bangui (Snow 1978).

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*. (Blancou 1948, Jehl 1974, Carroll 1988). Migrateur observé une seule fois: étangs de Landjia, 3 oct 1971.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*. (Jehl 1974, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Migrateur paléarctique ayant ses quartiers d'hiver dans le bloc forestier. Une obs., Mboko, 5 oct 1971; ex. tué dans la région de Bangui, 6 déc 1969 (IPB).

Faucon des chauves-souris *Machaeeramus alcinus*. (Berlioz 1934, Blancou 1938-1939, Snow 1978, Carroll 1988). Bangui, 20 jan, une obs.

Circaète brun *Circaetus cinereus*. (Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Une obs., méridionale pour cette espèce: Bozo 31 jan, adulte (en savane arborée).

Autour tachiro *Accipiter tachiro*. (Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, deux mâles, MNHN: 17 avr 1970 (JM) et 20 oct 1971. Il s'agit de *A. t. tousenellii*.

Autour minulle *A. erythropus*. (Bouet 1944, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Landjia, 6 mai 1970 (JM), mâle, MNHN; Bangui 24 jan 1974, femelle immature, MNHN. La Maboké, une obs., jan.

Autour à longue queue *Urotriorchis macrourus*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Kinga: une obs., juil.

Aigle blanchard *Stephanoaetus coronatus*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Un ex. tué par un chasseur dans les environs de Pisa, mars 1972.

Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus*. (Snow 1978, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Deux obs.: Gomoka, juil., Damara, nov.

Caille bleue *Coturnix chinensis*. (Bouet 1944). Landjia, 16 jan 1974, capture d'un adulte mâle.

Turnix nain *Turnix hottentota*. (Germain 1992). Rappel: Mboko, 24 jan 1975, une femelle, MNHN. Il s'agit de *T. h. nana*.

Râle nain à poitrine chatain *Sarothura rufa*. (Urban *et al.* 1986). Bangui: 10 nov 1968 (PR), 23 août 1969 (CC), femelles, MNHN.

Râle africain *Crex egregia*. (Bouet 1944, Snow 1978, Green 1984, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, 10 nov 1968 (RP), immature, MNHN. Boukoko, une obs., déc.

Petit poule d'eau africain *Gallinula angulata*. (Berlioz 1939, Snow 1978, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Landjia, 13 jan 1975, ex. femelle. Boukoko, une obs., mai.

Poule d'Allen *Porphyrio alleni*. (Carroll 1988). Boukoko, 19 mai, femelle, ovaire actif. Landjia, une obs., juin. Un ex., Bangui, juil. (JM, IPB).

Rhynchée *Rostratula benghalensis*. (Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Landjia, trois femelles capturées en jan, deux en mai-juin (ovaires actifs). Autres ex.: Boda, fév; Bobia, mai; lac Mamoun (JM), mars.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*. (Jehl 1974, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Bretagnolle 1993). Landjia, une obs, jan.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*. (Jehl 1974, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Landjia: visiteur d'hiver régulier, mais en très faible nombre; un ex., jan 1975.

Pluvier à front blanc *C. marginatus*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, mai, un ex., femelle immature. Landjia et plages de l'Oubangui dans cette même région: isolés et petits groupes, mai, nov, déc.

Bécasseau minute *Calidris minuta*. (Jehl 1974, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Germain 1992). Hivernant régulier à Landjia, plusieurs captures en déc.

Bécasseau de Temminck *C. temminckii*. (Jehl 1974, Green 1984). Landjia, 13 jan, un ex. (IPB).

Bécasseau cocorli *C. ferruginea*. (Green & Carroll 1991). Landjia, 7 oct 1973, une obs.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*. (Jehl 1974, Green 1983, 1984, Green & Carroll 1991). Landjia: hivernant assez abondant, 16 ex. entre 16 déc et 18 fév. Lac Mamoun, un ex., mars (JM).

Chevalier gambette *Tringa totanus*. (Dragesco 1961, Jehl 1974, Green 1983, 1984, Bretagnolle 1993). Visiteur d'hiver peu nombreux dans le sud de la RCA. Une obs., Landjia, précoce: 12 août 1972, deux individus.

Chevalier stagnatile *T. stagnatilis*. (Carroll 1988, Green 1984, Green & Carroll 1991). Landjia, 30 jan, un ex. mâle.

Goeland brun *Larus fuscus*. (Carroll 1988). Une observation isolée: Bangui, sur le fleuve, 9 jan 1973, adulte de la race nominale (dessus ardoisé sombre).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*. (Jehl 1974, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Bangui (île Mboulou), 5 fév et 2 avr 1978, mâles, MNHN. Fréquemment observé sur l'Oubangui, le plus souvent en petits groupes, entre 5 fév et 21 mai. Plus fortes densités en fin de saison sèche: plus de 100 observées sur quelques km, 23 avr 1978. Observé une seule fois sur les étangs de Landjia, 16 déc.

Tourterelle à tête bleue *Turtur brehmeri*. (Bouet 1944, Friedmann 1978, Green 1984, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi et île Bokassi, juin et oct: trois ex.

Tourterelle tambourinette *T. tympanistria*. (Blancou 1938-39, Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988). Assez nombreuses captures dans les régions de Bangui, Bozo, Sibut, Bambari, Bangassou, Rafat, en toutes saisons et toujours en sous-bois.

Perroquet vert à tête rouge *Poicephalus gullelmi*. (Bouet 1944, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, un ex., nov (JM, IPB).

Inséparable à collier noir *Agapornis swinderniana*. (Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Mbaki, mai, un ex., tué par un chasseur.

Touraco vert *Tauraco persa*. (Bouet 1944, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Boboui, août, un ex. (IPB).

Touraco à bec noir *T. schuetti*. (Blancou 1948, Bouet 1961, Snow 1978, Carroll 1988). Non signalé du département de la Lobaye (mention erronée dans une liste non publiée que Carroll a eu en main, cf. Germain 1992), mais connu de Bangui (Alline in Bouet 1961), ainsi que de Zémio, localité-type de *T. s. sharpei*.

Coucou solitaire *Cuculus solitarius*. (Blancou 1948, Snow 1978, Friedmann 1978, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Mbaki, avr, une obs.

Coucal noirou *Centropus grillii*. (Blancou 1938-39, Carroll 1988). Landjia, déc, une obs.; Bangassou, avr, une obs.

Coucal à nuque bleue *C. monachus*. (Bouet 1944, Snow 1978, Green 1983, Carroll 1988). Une obs. à Landjia, mars, et une à Bonganou, avr. Dans la région de Bangui, aujourd'hui très savanisée, l'espèce du genre la plus communément observée est *C. senegalensis*.

Engoulevent à épaulettes noires *Caprimulgus nigriscapularis*. (Carroll 1988, Germain 1992). Exemples: Kapou, mai, femelle, ovaire actif; Bozo, août, mâle.

Engoulevent terne *Caprimulgus inornatus*. (Blancou 1938-39, Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bozo, déc, un ex. mâle.

Martinet épineux de Sabine *Rhaphidura sabini*. (Blancou 1938-39, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Germain 1992). Landjia, avr, une obs. de deux (rappel); observé sur l'Oubangui, 20 km en amont de Bangui, avr, (F. Bretagnolle com. pers.).

Martinet à croupion blanc *Apus caffer*. (Berlioz 1939, Malbrant 1952, Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Bretagnolle 1993). Bozo, 13 août 1977, mâle, IPB. Obs.: Mbaki, 5 jan; environs de Sibut, mai (F. Bretagnolle com. pers.).

Petit Martin-chasseur à tête châtain *Ceyx lecontei*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké: 19 avr 1966, une femelle; 14 juin 1966, un immature, (RP) MNHN. Botambi, juil, un ex., IPB; Lotémo, sep et nov, plusieurs ex. (JPH).

Rolle à gorge bleue *Eurystomus gularis*. (Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, mai, une obs.

Barbu à gorge grise *Gynnohubucco bonapartei*. (Bouet 1944, Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 30 juil 1968, (RP) MNHN. Exemples: Botambi, nov, (JM, IPB); Mboko, oct; Ngoundji, mai. Observé près de Bangui et Mbaki, jan, fév.

Barbu de Sladen *G. sladeni*. (Carroll 1988). Mongoumba, jan 1975, une obs. d'un isolé (face nue et bec sombres, touffes claires). Signalé de la rive zairoise de l'Oubangui dans la même région (Schouteden 1962).

Petit Barbu grivelé *Pogonius scolopaceus*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, trois ex., mâles, juil, déc; Geringou, nov, un ex. mâle.

Barbu à croupion rouge *P. atroflavus*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, un ex., août.

Petit Barbu à gorge jaune *P. subsulphureus*. (Blancou 1958, Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 24 mai 1966 (RP), mâle, MNHN. Geringou, nov, un ex.

Petit Barbu à taches jaunes *Buccanodon duchaillui*. (Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, avr, un ex. femelle.

Barbu hérissé *Tricholaema hirsuta*. (Bouet 1944, Snow 1978, Carroll 1988). La Maboké, 21 déc 1966 (RP), adulte, MNHN. Geringou, nov, un ex. mâle.

Tachyphone pourpré *Trachyphonus purpuratus*. (Bouet 1944, Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Rafai, déc, un ex. (JM, IPB).

Indicateur tacheté *Indicator maculatus*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Gomoka, oct, un ex. (JM, IPB). Landjia, mai, un ex. mâle; Loténo, sep (JPH), trois mâles, une femelle, ovaire en activité (cette capture dans la Lobaye annule la réserve faite par Germain 1992).

Picule *Sasia africana*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 23 avr 1966 (RP), femelle, MNHN. Botambi, plusieurs ex., jan, juin, oct, nov.

Pic tacheté *Campepthera nivosus*. (Bouet 1944, Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988). Exemplaires: Botambi, juil; Geringou, fév, dont deux femelles ovaires actifs.

Pic à oreillons bruns *C. caroli*. (Bouet 1944, Snow 1978, Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Exemplaires: Botambi, avr, juil; Mboko juil; Ngoundji, jan.

Pic à poitrine tachetée *Dendropicus poecilolaemus*. (Bouet 1944, Snow 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Exemplaires: Botambi, jan; Mboko, déc; Bozo, fév.

Pic cardinal *D. fuscescens*. (Blancou 1938-39, Snow 1978, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Exemplaires: Mboko, mars, juin, sep; Ndélé près Bangui, mars, juin; Boda, oct.

Brève à poitrine fauve *Pitta angolensis*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Germain 1992). Botambi, 3 juil 1975, femelle, aile 118, manteau vert sombre, sus-caudales bleues sans nuance violacée (*P. a. angolensis*), MNHN. Comme on le remarquera, cet exemplaire appartient à la sous-espèce présente dans le sud-est du Cameroun, tandis que celui récolté beaucoup plus loin à l'est par Friedmann, près de Baroua, est de la race *longipennis*.

Hirondelle à queue courte *Psalidoprocne nitens*. (Green & Carroll 1991). La Maboké, 17 avr 1966 (RP), femelle, MNHN.

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola*. (Carroll 1988). Etangs de Landjia (ex.): 23 avr 1970, adulte (JM, IPB); 3 mars 1976, trois mâles (ailes 96, 97, 100) et trois

femelles (ailes 94, 96, 96), gonades des deux sexes au repos. Les caractères de coloration sont ceux de *R. p. paludibula*: gorge, poitrine et flancs d'un brun grisâtre clair, ventre et sous-caudales blancs. La distance entre Landjia et le lieu d'observation de l'espèce le moins éloigné (sud-est de Sahr, au Tchad, Hall & Moreau 1970) est 480 km. Carroll signale sa présence dans le parc de Manovo-Gounda-Saint Floris. Dans le sud du Tchad, elle est présente toute l'année (Salvan 1967-69) et la reproduction a été observée en jan-fév (Dragesco 1961). La place qu'occupent des tendances dispersives ou franchement migratoires dans le comportement des diverses populations afrotropicales d'Hirondelles paludicoles reste très mal connue (Curry-Lindahl 1981, Turner & Rose 1989); il semblerait qu'elle soit d'importance très irrégulière, dans le temps comme dans l'espace. Les incursions très méridionales constatées en RCA pourraient avoir été favorisées (au travers de perturbations ayant intéressé l'entomofaune?). par les déficits pluviométriques qui ont affecté, à partir de 1967, la zone sahélienne.

Hirondelle de rivage *R. riparia*. (Jehl 1974, Carroll 1988, Keith *et al.* 1992). Mboko, 25 jan 1975, femelle, aile 103, MNHN. Landjia, 21 jan, deux ex. mâles; plusieurs observations en jan-fév. Keith *et al.* (1992) signalent la reprise, dans l'ouest de la RCA, d'un sujet bagué au Danemark.

Hirondelle à longs brins *Hirundo smithii*. (Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Bretagnolle 1993). Sarki, jan, un ex.

Hirondelle noire *H. nigrita*. (Bouet 1944, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Observée, par couples, sur les plans d'eau méridionaux: Oubangui dans la région de Bangui, fév, avr, juin; Mbaïki, avr; rivière Lobaye à Bagandou, jan; rivière Kadéï près de Gamboula, sep.

Hirondelle de cheminée *H. rustica*. Nous nous bornerons ici à signaler la reprise à Boda (par un chasseur), le 15 déc 1974, d'un juvénile bagué au nid le 1 juil de la même année, à Romanswiller, Bas-Rhin, France.

Alouette sentinelle *Macronyx croceus*. (Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988). Observé, le plus souvent par paires, à Landjia et Bonganou, mars-juin.

Tchagra à tête brune *Tchagra australis*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, deux ex. 1966, dont un en sep 1966 (RP), MNHN. Obtenu à Botambi, déc; à Landjia, Mboko, Ndélé près Bangui, Géréngou, mars, mai, nov et déc; à Bozo, jan; Nassoulé, sep.

Gonolek noir *Laniarius leucorhynchus*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Ngoundji, 28 oct 1971, un ex., MNHN; mars, un ex. Egalement obtenu à Bangui, juin; Boda, juil; Nandobo, sep; Rafai (JM), déc.

Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*. (Oustalet 1904-05, Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Quelques captures et observations dans la région de Mbaïki-Bangui-Damara (juin-août, oct, déc) et 50 km au sud-est de Carnot (sep). Il s'agit, comme au Cameroun, de *L. c. smithii*, mais il est ici beaucoup moins commun.

Loriot à tête noir *Oriolus brachyrhynchus*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Mbaïki, mai, une obs. Manifestement peu

abondant, à la différence de ce qui s'observe dans le sud du Cameroun (Germain *et al.* 1973).

Loriot à ailes noires *O. nigripennis*. (Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, fév, un ex. (IPB).

Merle métallique à tête pourprée *Lamprotornis purpureiceps*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Gomoka, avr, un ex. (IPB). Bosongo, avr, une obs.

Merle métallique à queue violette *L. chalcurus*. (Blancou 1938-39, 1958, Schauensee 1949, Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970). Sarki, jan, un ex. mâle.

Merle métallique à longue queue *L. caudatus*. (Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Garba, fév, un ex. (IPB).

Echenilleur pourpré *Campephaga quiscalina*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Mboko, 17 mai, capture d'un couple, femelle avec ovaire actif, sous-espèce nominale. Ngoundji, mai, un ex. femelle; Bonganou, avr, obs. d'un mâle, dans un massif de parasoliers. Les observations centrafricaines prolongent sensiblement à l'est l'aire connue de la sous-espèce.

Bulbul gracieux *Andropadus gracilis*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, juil, un ex. femelle. Également capturé à Rafai, en même temps que *A. virens*, déc (JM).

Bulbul curvirostre *A. curvirostris*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, jan, un ex. de chaque sexe; Ngoundji, oct, deux mâles (dont un IPB).

Bulbul à bec grêle *A. gracilirostris*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 15 sep 1966 (RP), deux ex., MNHN. Cette espèce existe donc bien dans le bassin de la Lobaye (Carroll 1988).

Bulbul à moustaches jaunes *A. latirostris*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, deux ex. (RP), MNHN: 20 avr 1966, mâle; 6 août 1968. Cette espèce est, après *A. virens*, l'*Andropadus* le plus fréquemment capturé dans les sous-bois du sud-ouest de la RCA: Lotémo, La Maboké, Botambi, Ndélé près Bangui, Geringou. Également obtenu à Nagbalaka et Rafai. Des ovaires (108 examinés) ne sont trouvés actifs que de mai à août, tandis que chez *A. virens* cette même période se prolonge jusqu'en novembre.

Bulbul à queue blanche *Baeopogon indicator*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 13 juil 1968 (RP), mâle, MNHN; Ngoundji, 21 déc 1972, femelle, ovaire actif, MNHN. Également obtenu à Bozo, avr.

Bulbul de Falkenstein *Chlorocichla falkensteini*. (Carroll 1988). Kouango, 7 nov 1970 (JM), adulte, MNHN. Plusieurs captures en savane arbustive à Mboko et Bangui, juin, oct-déc.

Bulbul modeste *C. simplex*. (Carroll 1988). Plusieurs captures: Botambi, Bangui et environs, Bozo, Marali, Nassoulé, fév-déc. A Botambi, capturé une seule fois (juin), en lisière de canopée, dans des filets placés à 15 m du sol. Ovaires en activité: sep-déc, fév.

Bulbul icterin *Phyllastrephus icterinus*. (Carroll 1988, Carroll & Green 1991). Botambi: 8 mai 1973, mâle, MNHN; 24 jan 1974, femelle, MNHN. Autres ex.:

Botambi, mai; Lotémo, sep (JPH), un mâle et trois femelles (deux ovaires en activité).

Bulbul icterin tacheté *P. xavieri*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi ex.: mâle, 22 jan 1974, MNHN; mâle, jan, capturé en lisère de canopée, à 15 m du sol; mâle, avr, Lotémo, sep, deux mâles.

Bulbul à gorge blanche *P. albigularis*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 2 juin 1966 (RP), male, MNHN; Bangui (Kouanga), 10 déc 1969 (JM), un ex., MNHN. Botambi, une vingtaine d'ex., jan, mai, juil-déc; Géringou.

Bulbul de Reichenow *Criniger ndussumensis*. (Hall & Moreau 1970, Keith *et al.* 1992). Nous avons rapporté à *C. calurus emini*, dont un spécimen provenant de Botambi a figuré dans la collection IPB, tous les *Criniger* (19 ex.) que nous avons capturés dans la région de Bangui et en basse Lobaye, à l'exception d'un seul qui nous a paru devoir l'être à *C. ndussumensis*. Botambi, mai, mâle, aile 92, bec plus fin (huteur à la base 5.5 mm), sous-caudales assez fortement lavées de roussâtre.

Merle rouge-gorge *Sheppardia cyornithopsis*. (Hall & Moreau 1970). La Maboké, sans date (RP), un adulte, MNHN. Capture qui annonce une continuité de distribution de cette espèce entre ses deux aires subsppécifiques d'Afrique équatoriale: Cameroun méridional à Gabon et nord-est du Zaïre (où il est signalé des abords de Mobaye, Hall & Moreau 1970). Comparé avec ceux du Gabon et du Cameroun, ce spécimen (aile 72 sur l'oiseau en peau, mâle?) se présente avec des flancs légèrement plus ternes, d'un brun châtain plutôt que roux clair.

Rouge-gorge de forêt *Stiphrornis erythrothorax*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 6 août 1968 (RP), immature, MNHN. Botambi, huit ex., jan, avr, juil, nov, déc; Bangui et Rafat (JM), déc.

Cossyphé à ailes bleues *Cossypha cyanocampter*. (Carroll 1988, Keith *et al.* 1992). Botambi: jan, un ex. mâle; nov, femelle.

Alêthe à huppe rousse *Alethe diademata*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, 14 jan 1972, immature mâle, MNHN; 16 autres ex., avr, mai, juil, août. La Maboké, jan, un ex. (JM); Gomoka, nov, un ex.

Grive fourmilère à queue blanche *Neocossyphus poensis*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké (RP), un ex., sans date, MNHN; Botambi, 13 jan 1972, femelle, MNHN. Comparés avec ceux du Cameroun et du Gabon, ces exemplaires ont leurs parties dorsales d'un brun sensiblement plus chaud et des rectrices externes portant moins de blanc à leur extrémité (*N. p. praepectoralis*). Egalement capturé dans la région de Bangassou: Nagbalaka, avr, un mâle.

Grive akalât brune *Malacocincla fulvescens*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 16 mai 1966 (RP), mâle, MNHN; Bouar, 1970 (RP), adulte, MNHN. Botambi et île Bokassi, plusieurs captures, jan, juin, août, oct; ovaires trouvés actifs en juin et oct. Egalement obtenu à Bangui, entre cette ville et Damara, à Bozo et à Rafat.

Grive akalât à tête noire *M. cleaveri*. (White 1962, Green & Carroll 1991). La Maboké, 19 mai (RP), mâle, MNHN.

Cratérope capucin *Phyllanthus atripennis*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, 7 avr 1977, MNHN; "Oubangui", sans date (RP), MNHN. Les caractères de coloration sont ceux de *P. a. bohndorffi*. Quatre ex. capturés à Rafaï, déc (JM).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*. (Jehl 1974, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, 31 oct 1972, un ex., MNHN. Egalement capturé à Landjia, 20 avr 1978, un mâle.

Rousserolle effarvate *A. scirpaceus*. (Jehl 1974, Carroll 1988). Ngoundji, 24 jan 1972, mâle, MNHN. Autres captures: Bangui, 29 déc 1971, une femelle; Mboko, 2 mars 1972, un ex.; Landjia, jan 1976, deux femelles et un mâle; Rafaï, 15 déc 1970 (JM), un ex.

Rousserolle des cannes *A. rufescens*. (Carroll 1988). Route Bangui-Mbaki, 23 juin 1966 (RP), un ex., Bangui, 13 août 1969 (CC), mâle, MNHN. Egalement capturé à Mboko: juil, deux femelles dont une avec ovaire actif; août, une femelle.

Gobe-mouches jaune *Chloropeta natalensis*. (Carroll 1988). Bangui, 7 août 1969 (CC), femelle, MNHN. Egalement capturé à Kapou, Mboko, Landjia, Geringou, Ngoundji, Gomoka, Bozo, Marali, en mai (un ovaire en activité), sep, oct, déc-fév.

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta*. (Carroll 1988). Ngoundji: 17 mars 1972, femelle, MNHN; jour suivante, un mâle. Mbaki, 5 mars 1974, une obs. très probable. Il est à remarquer que *H. icterina* est également connu de la RCA, où Dybowski l'a obtenu sur la haute Kouma ("Poste de la Haute Kémo"), MNHN (Bouet 1944).

Fauvette des jardins *Sylvia borin*. (Jehl 1974, Carroll 1988). Visiteur d'hiver abondant dans les savanes préforestières du sud-ouest de la RCA: Mboko (savane arborée et cultures, 37 ex.), Landjia, Kapou, Bangui, Ngoundji, Bobui, Geringou, Bozo. Egalement capturée dans la région de Bambari et à Rafaï. Dates extrêmes de capture: 17 oct et 20 avr.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*. (Schauensee 1949, Malbrant 1952, Carroll 1988). Un mâle capturé à Mboko le 21 déc 1971, un mâle et une femelle le 2 mars 1972; Landjia, 21 jan 1975, un mâle; Geringou, 24-27 nov, trois ex. de chaque sexe.

Pouillot siffleur *P. sibilatrix*. (Carroll 1988). Captures: la Maboké, 29 jan 1970, un ex. (JM); Kapou, 28 déc 1971, une femelle; Mboko, 21 déc 1971, un mâle; Bozo, 26 nov 1974, un mâle et une femelle.

Cisticole à face rousse *Cisticola erythrops*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988). Bangui: 24 nov 1967 (RP), un ex., MNHN; 13 et 15 août 1969 (CC), mâle et femelle, MNHN; 29 déc 1971, femelle, MNHN. Mboko, 29 fév 1972, femelle, MNHN. Ngoundji, 17 mars 1972, mâle, MNHN. Nombreuses captures dans la région de Bangui; également obtenu à Bozo, dans la région Damara-Sibut et à Nassoulé. Ovais trouvés actifs en sep-oct.

Cisticole chanteuse *C. cantans*. (Blancou 1938-9, Bouet 1944, Carroll 1988). MNHN, mâles: Ngoundji, 26 et 27 jan 1972, 17 mars 1972; Marali, 13 juil 1972. Autres localités de capture: Kapou, Mboko, Geringou, Bozo, Zagwa.

Cisticole siffleuse *C. lateralis*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Green 1983,

Carroll 1988). MNHN: La Maboké, 22 sep 1966 (RP), un ex.; Ngoundji, 27 jan 1972, une femelle; Bogoin, 3 fév 1972, deux femelles. Autres localités de capture: Botambi, Mboko, Ndélé près Bangui, Nandobo.

Cisticole roussâtre *C. galactotes*. (Berlioz 1935, Green 1983, Carroll 1988). Capturé à Landjia (étangs, 36 ex.), Mboko, Kapou, Géringou. Un ovaire trouvé actif en août.

Cisticole striée *C. natalensis*. (Bouet 1944, Malbrant 1952, Friedmann 1978, Carroll 1988). Mboko, oct, une femelle.

Fauvette à ailes rousses *Prinia erythroptera*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Ngoundji 27 mai 1972, femelle, MNHN. Egalement capturée à Mboko, oct; Bozo, fév, avr, Marali, sep; Zagwa, nov.

Fauvette-roitelet rayée *Prinia bairdii*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, jan, un mâle (IPB).

Fauvette des buissons à tête grise *Apalis flavida*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Germain 1992). Ngoundji, mars, un ex. mâle.

Fauvette grise à ailes rousses *Drymocichla incana*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Germain 1992). Sarki, jan, un ex. mâle (IPB).

Camaroptère à sourcils *Camaroptera superciliaris*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Capturé à Botambi, jan; Bangui, juin et oct; Ndélé près Bangui, sep; Ngoundji, jan.

Camaroptère à dos vert *C. chloronota*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, six ex. (RP) au MNHN: 16 mars, 21 avr (deux), 6, 19 et 31 mai 1966; Botambi, 10 jan 1972, un ex., MNHN. Autres captures: Botambi, août, oct; environs de Bambari, nov.

Fauvette crombec verte *Sylvietta virens*. (Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 31 mai 1966 (RP), mâle, MNHN. Autres localités de capture: Botambi, Landjia, Bangui, Boboui, Gomoka, Nassoulé, en toutes saisons.

Hylia verte *Hylia prasina*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, 10 jan 1972, male, MNHN; quelques autres captures, jan, juil, oct, nov. Capturé une fois à Ndélé près Bangui, juin.

Gobe-mouches pygmée *Muscicapa adusta*. (Blancou 1938-39). Bouar, 1970 (RP), un ex., MNHN.

Gobe-mouches à gorge grise *M. griseigularis*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). La Maboké, 6 août 1968 (RP), un ex., MNHN.

Gobe-mouches noir *Ficedula hypoleuca*. (Blancou 1938-39, Carroll 1988). MNHN: Bangui, 17 nov 1970 (JM), un ex.; Ngoundji, 24 jan 1972, femelle. Autres ex., peu nombreux: Ngoundji et Bozo, entre 23 oct et 9 mars, Kapou un obs. Rappelons que le Gobe-mouches à collier *F. albicollis* a été obtenu en RCA par Dybowski, sur la haute Kouma (MNHN, Bouet 1944): trois mâles, début mars 1892, ayant revêtu leur plumage d'été, et dont le réexamen (MG) écarte toute éventualité de confusion avec *F. semitorquata*.

Gobe-mouches forestier *Fraseria ocreata*. (Bouet 1944, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Ile Bokassi, obs. d'un petit groupe, juin.

Gobe-mouches à sourcils blancs *F. cinerascens*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Captures: sur l'île Bokassi, juin; Nagbalaka, avr, immature.

Gobe-mouches pâle *Bradornis pallidus*. (Blancou 1938-39, Carroll 1988). Plusieurs captures dans la région de Bangui, en mars, juin, oct-jan, uniquement dans le secteur périforestier.

Gobe-mouches soyeux à joues noires *Batis minor*. (Bouet 1944, Green 1984, Carroll 1988). Bogoin, 4 fév 1972, mâle, race *erlangeri*, MNHN. Une vingtaine d'ex., capturés à Mboko, Ndélé près Bangui, Ngoundji, Géringou, Bozo, Marali et Bogoin, en jan-juin, août-nov.

Gobe-mouches caronculé *Platysteira castanea*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 2 et 6 mai 1966 (RP), une femelle, un immature, MNHN. Botambi (forêt), 14 ex.: jan, mars-mai, juil-août, oct, dont deux femelles en état de pondre en avr et mai. Les autres captures intéressent les savanes méridionales: Mboko, Ngoundji, Bo, Bozo et environs de Bambari, mais toujours dans des galeries forestières, à l'exception de celle de Mboko (savane arbustive, avr, un couple).

Gobe-mouches noir huppé *Trochocercus nitens*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, juil, femelle, ovaire en activité.

Moucherolle à ventre roux *Terpsiphone rufiventer*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Capturé à Botambi (entre jan et nov): six ex., dont un couple, en jan (femelle avec ovaire en début d'activité) et une femelle en état de pondre en mars. Egalement obtenu à Lotémo, sep, un ex. de chaque sexe. Il s'agit dans tous les cas de la sous-espèce *schubotzi*, décrite de Bangui (dos roux, tête gris bleuté).

Moucherolle de Bates *T. batesi*. (Green 1984, Carroll 1988, Green & Carroll 1991, Germain 1992). Rappel: un mâle capturé à Botambi, oct.

Soui-manga violet *Anthreptes longuemarei*. (Blancou 1938-39, 1958, Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Green 1983, Carroll 1988). Capturé à Ngoundji, oct; Sarki, jan; Rafat, déc (JM). Observé à Bozo (accouplements en jan) et Kapou, fév.

Soui-manga à gorge verte *Nectarinia rubescens*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Exemplaies: Mboko, Bangui, Géringou, fév, mars, juin; Mbalki, jan, une obs.

Soui-manga de Bouvier *Nectarinia bouvieri*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970). Bangui, 20 août 1969 (CC), femelle, MNHN. Egalement obtenu par Moindrot (IPB), à Bangui, sep, Rafat, déc.

Soui-manga à touffes oranges *N. osea*. (Schauensee 1949, Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970). Bozo: 8 sep 1976, deux mâles en plumage nuptial incomplet (un au MNHN).

Soui-manga superbe *N. superba*. (Blancou 1948, Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Deux ex., Landjia et Mboko, mai et oct; observé à Pisa, mai.

Bruant de Cabanis *Emberiza cabanisi*. (Blancou 1938-39, Bouet 1944, Friedmann 1978, Green 1983, Carroll 1988). Exemplaies: Ngoundji, Mboko, Landjia, Bo, en jan, mai-juil, sep, oct.

Bruant à ventre jaune *E. forbesi*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Green

1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Sarki, jan, un ex.

Gros-bec à front blanc *Amblyospiza albifrons*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, 20 août 1969 (CC), mâle, MNHN. Egalement capturé à Botambi, oct; Bo et Bozo, juin.

Tisserin baglafaecht *Ploceus baglafaecht*. (Germain 1992). Deux mâles, MNHN: Ngoundji, 27 mai 1972 et Marali, 13 juil 1972. Egalement capturé à Bogoin, fév, un mâle. **Tisserin noir de Vieillot** *Ploceus nigerrimus*. (Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Hall & Moreau (1970) ne le signalent que des abords du confluent de l'Uellé. Commun dans les milieux anthropisés du sud-ouest de la RCA (régions de Bangui, Damara, Bozo et Marali), où ses colonies, souvent associées à celles de *P. cucullatus*, ne sont guère susceptibles d'être longtemps passées inaperçues; il semblerait donc que sa forte implantation actuelle y soit le fait d'une progression géographique assez récente, à partir du nord du Zaïre et du sud du Cameroun. Très nombreuses captures dans la région de Bangui; des ovaires actifs en mars, avr, juil, sep et oct. Egalement commun dans la région de Berbérati. Il nous a par contre paru manquer ou être beaucoup moins fréquent dans l'est du pays (région de Bangassou, 1974).

Tisserin à tête noire *Ploceus melanocephalus*. (Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Capturé ou observé à Mboko, Landjia, Geringou, Kapou, en juin, août-oct.

Tisserin gros-bec *P. superciliosus*. (Blancou 1938-39, Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 1 juin 1966 (RP), mâle, MNHN. Nombreuses captures à Mboko, Landjia, Ndélé près Bangui, Ngoundji, Geringou, Gomoka et Bozo; déc-mars, sep, oct.

Tisserin à lunettes *P. ocularis*. (Berlioz 1939, Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Bangui, 30 août 1969 (CC), femelle, MNHN; Mboko, 24 août 1972, mâle, MNHN. Fréquentes captures à Mboko, Landjia, Geringou; avr-août, oct-déc; un ovaire actif en juin. Egalement capturé à Sarki, jan.

Malimbe de Cassin *Malimbus cassini*. (Carroll 1988). Botambi, juil, capture d'un mâle (IPB). L'espèce est connue du Zaïre limitrophe (territoires de Gemena et Libenge, Schouteden 1962).

Malimbe à bec bleu *M. nitens*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Un ex. capturé dans la région de Bangui, déc, par Moindrot, (IPB); également obtenu à Rafai, déc.

Malimbe à tête rouge *M. rubricollis*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). La Maboké, 17 juil 1968 (RP), mâle, MNHN.

Malimbe huppé *M. malimbicus*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, 11 jan 1972, mâle, MNHN; août, femelle.

Travailleur à bec rouge *Quelea erythrops*. (Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Quelques captures et observations à Bangui et dans la région environnante: Botambi, Kapou, Landjia, Mboko; fév, mars, juin-août.

Vorabé *Euplectes afer*. (Blancou 1939-39, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Capturé à Landjia et Bangui, juin-oct, mais difficile à identifier en dehors de la période nuptiale.

Veuve noire *E. ardens*. (Blancou 1938-39, Green 1983, Carroll 1988). Nombreuses captures et observations de mâles en plumage nuptial, août-déc, dans les savanes des régions de Bangui, Bozo, Bouca, Sibut, Carnot, Bambari.

Petit Moineau soulcie *Petronia dentata*. (Malbrant 1952, Hall 1970, Carroll 1988). Bogoin, 3 fév 1972, femelle, MNHN; même date, deux ex. dont une femelle, ovaire actif. Bozo, fév, un ex.

Combassou noir *Vidua wilsoni*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970). Nous avons rapporté à cette espèce la seule veuve du groupe *Hypochera* que nous ayons eue en main: Landjia, oct, mâle; plumage noir à reflets violacés (ni bleus, ni verts), remiges et rectrices brunes, bec blanc, très légèrement rosé, iris brun, aile 65 (IPB). Espèce que son parasitisme associe à *Lagonosticta rufopicta* (Payne 1985).

Bengali tacheté à ventre roux *Clytospiza monteiri*. (Blancou 1938-39, Bouet 1944, Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). La Maboké, 15 sep 1966 (RP), mâle, MNHN; Bangui 20 nov 1967, et 15 août 1969 (CC), mâle, MNHN. Très nombreuses captures, en toutes saisons, dans la région de Bangui (principalement dans le secteur périforestier, mais quelques captures intéressent la zone forestière); également capturé dans les régions de Bozo, Sibut, Marali, Carnot, Berbérati, Bocaranga, Bambari, Bangassou, Rafat. Oaires en activité, sep-déc.

Bengali tacheté à ventre noir *C. dybowskii*. (Blancou 1938-39, Bouet 1944, Blancou 1958, Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Bangui, 18 août 1969 (CC), mâle, MNHN. La localité type de l'espèce est sur la haute Kouma ("haute Kémo", Dybowski). Beaucoup moins souvent capturé et observé que l'espèce précédente: Bangui et Kapou, déc; Bo, juin; Bozo, mars, juin, sep; Nandobo, mars, sep; Sarki, jan; Rafat, déc (JM).

Bengali vert tacheté *Hypargos nitidulus*. (Friedmann 1978). La Maboké, 18 mai 1966 (RP), mâle, MNHN. En RCA, l'espèce n'était jusqu'ici connue que de l'Est (environs de Baroua).

Sénégal nêgre *Nigrita canicapilla*. (Friedmann 1978, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Exemplaires: Botambi, mai (IPB), août; Mboko, sep, nov; Bangui, nov; Ndélé près Bangui, juin, une femelle avec ovaire actif.

Sénégal nêgre à front jaune *N. luteifrons*. (Carroll 1988). Bozo, mars, ex. mâle. Bosongo, juil, une obs.

Sénégal brun à ventre roux *N. bicolor*. (Friedmann 1978, Carroll 1988). Géringou, 10 juin 1977, femelle, MNHN. Egalement capturé à Botambi et à Rafat, déc, par Moindrot.

Sénégal brun à ventre blanc *N. fusconata*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Botambi, mai, juin, deux ex. mâles; Ngoundji, mai, ex. mâle.

Astrild fourmilier à gorge rousse *Parnoptila woodhousei*. (Hall & Moreau 1970, Friedmann 1978, Carroll 1988). Botambi, jan, ex. femelle.

Gros-bec sanguin *Spermophaga haematina*. (Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Assez nombreuses captures dans les zones forestière et périforestière de la région de Bangui, en toutes saisons; ovaires actifs de juil à nov. Egalement capturé à Bozo, nov; Nandobo, sep.

Sénégal vert à joues blanches *Nesocharis capistrata*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988). Bangui, 22 nov 1967 (RP), mâle, MNHN. Capturé, toujours en faible nombre, à Mboko, juin; Bozo, août, sep; dans les régions de Bossangoa (Dounda), juil; de Bocaranga (Sarki), jan, fév; de Bambari (Marago), nov.

Sénégal à cape noire *Estrilda nonnula*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988). Bangui, 28 août 1969 (CC), mâle, MNHN. Commun en toutes saisons dans la région de Bangui: ex. de Mboko, Landjia, Bangui, Kapou, Ngoundji, Geringou; des ovaires actifs en sep et oct. Aucune obs., dans cette même région, de l'espèce voisine *E. atricapilla*, laquelle a par contre été signalée de l'extrême sud-ouest de la RCA (préfecture de la Sangha-Mbaïre: Green & Carroll 1991).

Sénégal ondulé *E. astrild*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Assez nombreuses captures et observations dans la région de Mbatki-Bangui, en toutes saisons; une femelle en état de pondre en sep. Egalement obtenu à Bozo et près de Bambari.

Amarante masqué *E. larvata*. (Oustalet 1904-05, Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988, Germain 1992). Bozo, sep, capture d'un couple; Marali, une obs.

Amarante pointé *Lagonosticta rufopicta*. (Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Green 1983, 1984, Carroll 1988). Mboko, 24 août 1972, mâle, MNHN. Plusieurs fois capturé dans la région de Bangui, en zone périforestière: Kapou, Bangui, Mboko, Landjia, Ngoundji et Geringou, en toutes saisons. Un ovaire actif en oct.

Amarante flambé *L. rubricata*. (Blancou 1938-39, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). MNHN: Mboko, 24 août 1972, femelle; Ngoundji, 25 jan 1972, femelle. Capturé en toutes saisons dans la zone périforestière de la région de Bangui, ainsi qu'à Bozo, Marali, Sarki et Zagwa. Ovaires actifs de sep à déc.

Ventre-orange *Amandava subflava*. (Malbrant 1952, Hall & Moreau 1970, Green 1983, Carroll 1988, Bretagnolle 1993). Capturé dans le secteur périforestier de la région de Bangui, en toutes saisons: Mboko, Landjia, Kapou, Bangui, Geringou. Un ovaire actif en nov.

Spermète-pie *Lonchura fringilloides*. (Bouet 1944, Hall & Moreau 1970, Carroll 1988). Capturé plusieurs fois dans le secteur périforestier de la région de Bangui: Mboko, Landjia, Bangui, Bonganou, Geringou, Ngoundji, Boboui, en jan, juil, oct et nov.

Spermète à bec bleu *L. bicolor*. (Carroll 1988, Green & Carroll 1991). Capturé ou observé en toutes saisons dans la région de Mbatki-Bangui, notamment à Botambi, Landjia, Mboko et Geringou. Egalement capturé ou observé à Bozo, Marali, Camot, Nandobo, Marago; Rafar (JM). Des ovaires actifs en sep-nov.

Remerciements

Nous tenons tout particulièrement à remercier MM. C. Erard et F. Roux qui nous ont ouvert les collections du Muséum et souvent aidés de leurs avis. Nous sommes redevables à Mme. C. Choux, MM. le Dr. J. Moindrot et R. Pujol, d'un précieux matériel déposé dans ces mêmes collections. Mm. R.J. Dowsett, R.A. Cheke, A.A. Green et A. Tye nous ont fait bénéficier de judicieuses remarques. Nos remerciements vont également à MM. F. Bretagnolle, J. Germain, J.-P. Hervé, le Rev. M. Martorell et le Médecin-Colonel Morel, pour des récoltes ou des observations, ainsi qu'à M. N. Rankpairo, pour toute la part qu'il a prise au travail de capture.

Bibliographie

- BERLIOZ, J. (1934) Etude d'une collection d'oiseaux de l'Oubangui-Chari. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 6: 228-234.
- BERLIOZ, J. (1935) Etude d'une collection d'oiseaux de l'Afrique Equatoriale Française. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 7: 349-353.
- BERLIOZ, J. (1939) Etude d'une nouvelle collection d'oiseaux de l'Oubangui-Chari (A.E.F.). *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 11: 526-530.
- BLANCOU, L. (1938-1939) Contribution à l'étude des oiseaux de l'Oubangui-Chari occidental (bassin supérieur de l'Ouham). *Oiseau Rev. fr. Orn.* 8: 405-430, 642-649; 9: 58-88, 255-277, 410-485.
- BLANCOU, L. (1948) Contribution à l'étude des oiseaux de l'Oubangui-Chari oriental (Haut Mbomou). *Oiseau Rev. fr. Orn.* 18: 33-77.
- BLANCOU, L. (1958) Contribution à l'étude des oiseaux de l'Oubangui-Chari méridional. Bouar et Bangui (Bassin de la Lobaye). *Oiseau Rev. fr. Orn.* 28: 189-212.
- BOUET, G. (1944) Révision des collections d'oiseaux recueillis au Congo et dans l'Oubangui par la mission J. Dybowski (avril 1891-mai 1892). *Oiseau Rev. fr. Orn.* 14: 44-88.
- BOUET, G. (1955, 1961) Oiseaux de l'Afrique Tropicale. *Faune de l'Union Française*, 16 et 17, O.R.S.T.O.M., Paris.
- BOULVERT, Y. (1986) *Carte phytogéographique de la République Centrafricaine. Notice explicative*. O.R.S.T.O.M., Paris.
- BRETAGNOLLE, F. (1993) An annotated checklist of birds of north-eastern Central African Republic. *Malimbus* 15: 6-15.
- CARROLL, R.W. (1982) An ornithological investigation of the Central African Republic. M.Sc. thesis, Southern Connecticut State College, New Haven.
- CARROLL, R.W. (1988) Birds of the Central African Republic. *Malimbus* 10: 177-200.
- CHAPIN, J.P. (1953) The Birds of the Belgian Congo. Tome 3. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 75A.

- CURRY-LINDAHL, K. (1981) *Bird Migration in Africa*, 2 vol. Academic Press, London.
- DRAGESCO, J. (1961) Oiseaux es savanes d'Afrique équatoriale. *Oiseau Rev. fr. Orn.* 31: 178-192, 262-271.
- FRIEDMANN, H. (1978) Results of the Lathrop Central African Republic Expedition 1976, Ornithology. *Los Angeles Co. Mus. Sci.* 287: 1-12.
- GERMAIN, M. (1992) Sur quelques données erronées concernant l'avifaune de la Lobaye, République Centrafricaine. *Malimbus* 14: 1-6.
- GERMAIN, M., DRAGESCO, J., ROUX, F. & GARCIN, H. (1973) Contribution à l'ornithologie du Sud-Cameroun. II. Passeriformes. *Oiseau Rev. fr. Orn.* 43: 212-259.
- GREEN, A.A. (1983) The birds of Bamingui-Bangoran National Park, Central African Republic. *Malimbus* 5: 17-30.
- GREEN, A.A. (1983) Additional bird records from Bamingui-Bangoran National Park, Central African Republic. *Malimbus* 6: 70-72.
- GREEN, A.A. & CARROLL, R.W. (1991) The avifauna of Dzanga-Ndoki National Park and Dzanga-Sangha Rainforest Reserve, Central African Republic. *Malimbus* 13: 49-66.
- HALL, B.P. & MOREAU, R.E. (1970) *an Atlas of Speciation in African Passerine Birds*. British Museum (Natural History), London.
- JEHL, H. (1974) Quelques migrateurs paléarctiques en République Centrafricaine. *Alauda* 42: 397-406.
- KEITH, S., URBAN, E.K. & FRY, C.H. (1992) *The birds of Africa*, vol. 4. Academic Press, London.
- LOUETTE, M. (1981) The birds of Cameroon. An annotated checklist. *Verhandl. Kon. Acad. Wetensch. Lett. Schone Kunst. Belg.* 43.
- MALBRANT, R. (1952) *Faune du Centre Africain Français (Mammifères et Oiseaux)*. Lechevalier, Paris.
- NIKOLAUS, G. (1987) Distribution atlas of Sudan's birds with notes on habitats and status. *Bonn. zool. Monogr.* 25: 1-322.
- PAYNE, R.B. (1985) The species of parasitic finches in West Africa. *Malimbus* 7: 103-113.
- OUSTALET, M.E. (1904-1905) Catalogue des oiseaux rapportés par la mission Chari-Lac Tchad. *Bul. Mus. Nat. Hist. Nat.* 10: 431-437, 537-542; 11: 10-16.
- SALVAN, J. (1967-1969) Contribution à l'étude des oiseaux du Tchad. *Oiseau et Rev. fr. Orn.* 37: 255-284; 38: 53-85, 127-150, 249-273; 39: 38-69.
- SCHAUENSBEE, R.M. DE (1949) Results of the Carpenter African Expedition, 1947-1948. Part I: Birds. *Notulae Naturae* 219: 1-16.
- SCHOUTEDEN, H. (1962) La faune ornithologique des districts de la Mongala et de L'Ubangi. *Doc. zool. Mus. Roy. Afr. Centr.* 3: 1-144.
- SNOW, D.W. (1978) *An Atlas of Speciation in African Non-Passerine Birds*. British Museum (Natural History), London.
- TURNER, A. & ROSE, C. (1989) *a Handbook to the Swallows and Martins of the World*. Christopher Helm, London.

- URBAN, E.K., FRY, C.H. & KEITH, S. (1986) *The Birds of Africa*, vol. 2. Academic Press, London.
- WHITE, C.M.N. (1962) *A Revised Check List of African Shrikes, Orioles, Drongos, Starlings, Crows, Waxwings, Cuckoo-Shrikes, Bulbuls, Accentors, Thrushes and Babblers*. Government Printer, Lusaka.

Annexe

Index des localités citées.

Conventions: SF, secteur de la forêt dense humide; SPF, secteur pérfrestier, DSG, domaine soudano-guinéen; DMS domaine médio-soudanien; DSS domaine soudano-sahélien.

Bagandou (SF)	3°35'N	17°53'E
Bambari (DSG)	5°46'N	20°40'E
Bangassou (SF)	4°50'N	23° 7'E
Bangui (SPF)	4°22'N	18°35'E
Baroua, rivière Oussi (DSG)	5°20'N	24°20'E
Berbérati (SF)	4°16'N	15°47'E
Bo (SPF)	4°36'N	18°21'E
Bobia (SPF)	4°48'N	18°15'E
Bobouï (SPF)	4°37'N	18°19'E
Bocaranga (DMS)	6°59'N	15°39'E
Boda (SPF)	4°20'N	17°30'E
Bogoin (DSG)	5°20'N	17°38'E
Bokassi (île) (SF)	4°14'N	18°34'E
Bonganou (SF)	4°16'N	18°17'E
Bossangoa (DMS)	6°29'N	17°27'E
Bossembélé (DSG)	5°25'N	17°40'E
Botambi (SF)	4°12'N	18°30'E
Bouar (DSG)	5°57'N	15°36'E
Bouca (DMS)	6°30'N	18°17'E
Boukoko (étang) (SF)	3°54'N	17°54'E
Bozo (DSG)	5°10'N	18°30'E
Bosongo (SF)	4°13'N	18°16'E
Carnot (DSG)	4°56'N	15°52'E
Damara (SPF)	4°58'N	18°42'E
Dékolo (SF)	4°43'N	22°40'E

Doumba (DMS)	6°50'N	17°58'E
Gamboula (SPF)	4°8'N	15°9'E
Garba (DSS)	9°12'N	20°30'E
Géringou (SPF)	4°35'N	18°34'E
Gomoka (SPF)	4°38'N	18°16'E
Grimari (DSG)	5°44'N	20°3'E
Haute Kouma (DSG)	6°17'N	19°35'E
Kapou (SPF)	4°15'N	18°16'E
Kembé (SPF)	4°36'N	21°54'E
Kinga (SF)	3°43'N	17°43'E
Kouango (SPF)	4°58'N	19°59'E
Landjia (étangs) (SPF)	4°22'N	18°40'E
Lotémo (SF)	3°38'N	17°54'E
Maboké (la) (SF)	3°54'N	17°50'E
Mamoun (lac) (DSS)	10°5'N	21°55'E
Manovo-Gounda (Parc) (DSS)	9°30'N	21°0'E
Marago (DSG)	5°49'N	20°44'E
Marali (DSG)	6°3'N	18°24'E
Mbaïki (SF)	3°50'N	18°0'E
Mboko (SPF)	4°22'N	18°42'E
Mboro (SF)	3°53'N	18°2'E
Mobaye (SPF)	4°19'N	21°11'E
Mongoumba (SF)	3°38'N	18°36'E
Nagbalaka (SF)	4°45'N	22°50'E
Nandobo (DSG)	4°39'N	15°48'E
Nassoulé (SPF)	4°15'N	15°23'E
Ndélé près Bangui (SPF)	4°34'N	18°27'E
Ngaoda (DSG)	5°48'N	20°13'E
Ngoundji (SPF)	4°39'N	18°34'E
Pisa (SF)	4°3'N	18°12'E
Rafaï (DSG)	4°58'N	23°56'E
Sarki, rivière Kouï (DSG)	6°57'N	15°25'E
Sibut (DSG)	5°44'N	19°5'E
Yaka (SF)	4°8'N	18°15'E
Zagwa (DSG)	5°46'N	20°9'E
Zémio (DSG)	5°2'N	25°8'E